



Bilan de la santé des forêts – Centre-Val de Loire

Année 2025

Faits marquants

- ➔ Nos forêts ont subi des chablis notables, notamment dans le Loir-et-Cher en juin
- ➔ Le retour de l'enquête sur les chênaies nous indique une stagnation globale de l'état sanitaire des chênes depuis 2020, sauf sur quelques massifs qui se dégradent
- ➔ Les chênes sont confrontés à un nouvel insecte : un foyer de punaise réticulée a en effet été observé dans le Loir-et-Cher, en plus de sa présence discrète à Olivet (45) depuis plusieurs années

Indicateurs de la santé des principales essences

Santé des essences		Principaux problèmes et niveau d'impact	
Chêne pédonculé		Station Défoliation Sécheresse	
Chêne rouvre		Sécheresse Défoliation	
Châtaignier		Sécheresse Chancre Encre	
Pin sylvestre		Sphaeropsis sapinea Sécheresse et température	
Pin maritime		Pyrale du tronc Cochenille du pin maritime Rouille courbeuse (plantations)	
Pin laricio		Maladie des bandes rouges	
Peuplier		Sécheresse en plantation	

État de santé :

- Bon
- Moyen
- Médiocre

Niveau d'impact des problèmes :

- Faible
- Moyen
- Fort

Suivi des principaux problèmes

- Problème absent ou à un niveau faible
- Problème nettement présent, impact modéré
- Problème très présent, impact fort

Essences	Problèmes observés	2021	2022	2023	2024	2025
Toutes essences	Sécheresse					
Feuillus	Défoliateurs précoces					
	Bombyx disparate					
	Oïdium des chênes					
	Dépérissement de chêne					
	Encre du châtaignier					
	Chalarose du frêne					
Peupliers	Puceron lanigère					
Résineux	Scolytes des résineux					
	Maladie des bandes rouges					
	Processionnaire du pin					

Événements climatiques de 2025



Hiver
(Déc. Jan. Fév.)

Printemps
(Mars Avr. Mai)

Été
(Juin Juil. Août)

Automne
(Sept. Oct. Nov.)



Légèrement supérieures aux normales : +0,4°C, avec 12 à 15 jours de gel

Supérieures aux normales de 1,2°C

Très supérieures aux normales (3^e été le + chaud depuis 1945, +1,8°C)

Septembre froid (records de fraîcheur en fin de mois), octobre proche des normales

Températures



Proche de la normale (sauf 28, nord 37 et ouest 41 avec 20% à 40% d'excédent)

Déficit marqué (-30% en moyenne), mai très sec (30,2 mm)

Déficit global (-10%), mais fortes disparités locales (de -50% en 18 à +80% en 28)

Abondantes en septembre (+80% localement), normales en octobre (sauf 28 et sud 18 en déficit)

Pluviométrie



Vents forts en janvier (rafales > 100 km/h)

Records de chaleur en mai (jusqu'à 33,2°C : record absolu)

Tempêtes le 25/06 (sud 41 et 28) et le 13/08 (est 18), tornade le 21/07 (37)
Vagues de chaleur en juin et en août

Tempête le 23/10 sur Montrieux (41)

Faits marquants



Conséquences sur la forêt

Exploitation et préparation avant plantation empêchés par l'humidité des sols (automne précédent très humide)

Reprise des plantations affectée

Plusieurs centaines d'hectares ravagés par le vent

Dégâts de vent localisés

BILAN


Cette année climatique a surtout marqué les forêts par les dégâts de tempête, en particulier dans le Loir-et-Cher. Après deux années à faible déficit hydrique, l'année 2025 a de nouveau connu des périodes de sécheresse, avec des vagues de chaleur en mai, août et surtout juin, pouvant impacter la reprise des plantations.

Dégâts de tempête

Le 25 juin, des rafales dépassant 150 km/h ont frappé le Loir-et-Cher et le Cher, provoquant casse de troncs (volis) et déracinements (chablis) sur résineux et feuillus. Environ 900 hectares de forêt sont sévèrement impactés. Cet événement compromet la valeur commerciale du bois, rendant une exploitation rapide indispensable. La masse de bois au sol accroît le risque d'incendie et nécessite un dégagement rapide des parcelles selon les consignes DFCI.

Chez les pins, les champignons, agents de bleuissement, dégradent l'aspect du bois, tandis que les scolytes trouvent des sites de ponte favorables. Leur cycle de 4 à 6 semaines est accéléré par les températures estivales, menaçant les pins fragilisés par la sécheresse. La récolte des pins est prioritaire.

Chez les chênes, les insectes piqueurs attaquent la grume, entraînant une dépréciation rapide, surtout en présence de sciure blanche. Le risque sanitaire est différé en 2026, mais il faut récolter les chablis avant infestation.



Cartographie des dégâts par télédétection dans le secteur de Chambord (41)


Enquête sur l'état sanitaire de 18 chênaies de notre région

Avec plus de la moitié des surfaces forestières, l'état sanitaire de la chênaie est un enjeu majeur en Centre-Val de Loire. Les houppiers des chênes de 18 massifs ont été notés suivant le protocole DEPERIS en 2020 puis en 2025, soit 543 placettes et près de 10 000 arbres.

Un tiers des forêts observées est en bon état, tandis que les deux tiers restants sont en état moyen, deux massifs en état dégradé. Seuls deux massifs se sont dégradés significativement depuis 2020, l'état des autres massifs est stable.

Le bilan de cette seconde campagne est donc plutôt rassurant. Cette situation globale est évidemment plus contrastée à des échelles plus fines, où les sols, le climat et la sylviculture diffèrent parfois fortement.

Cette enquête sera reproduite périodiquement, afin de mieux appréhender l'évolution de l'état sanitaire et les phénomènes de dépérissement, qui ne peuvent être jugés que sur plusieurs années voire des décennies pour les chênes.



État sanitaire des massifs forestiers observés lors du road sampling 2025

La punaise réticulée du chêne est arrivée

L'insecte, repéré en 2017 vers Toulouse, s'est depuis propagé dans le Sud-Ouest puis le Centre-Est, sa progression se poursuit. Ses premières observations en Centre-Val de Loire sont intervenues au bord du Loiret en 2021 puis dans le Loir-et-Cher en 2025 sur une aire d'autoroute. La présence de ce ravageur marque la coloration du feuillage des chênes en fin d'été, elle peut être confondue avec l'oïdium. On retrouve à la face inférieure de la feuille, les insectes, les pontes et ses déjections noires caractéristiques.

Dans l'aire d'origine de cette espèce les dommages causés sont faibles et en comparant avec les conséquences minimales du tigre du platane introduit en Europe en 1964, on peut espérer que les dommages resteront faibles en forêt. Néanmoins cela ajoute un facteur de stress supplémentaire aux stress déjà présents (sécheresse, canicule, défoliateurs...) que subissent les chênes. Des travaux sont en cours sur le sujet, en particulier sur l'effet cumulé de la punaise et de la sécheresse. Dans les parcs et jardins, le jaunissement des feuilles au cours de l'été et leur chute prématurée sont essentiellement un désagrément esthétique.



Déjections, larves et adultes (blanc : juste nymphosés) de tigre du chêne

Les brèves

→ **Un foyer de nématode du pin dans les Landes** : ce ver microscopique pathogène a été détecté en forêt dans le cadre du programme de surveillance dédié. Les arbres touchés ainsi que tous les résineux situés dans les 500 m sont détruits selon un protocole approprié, les résineux situés dans les 20 km font aussi l'objet de mesures d'exploitation spécifiques. La surveillance se poursuit dans le secteur, comme sur l'ensemble du territoire national. Plus d'informations : voir le [site du ministère](#) et de la [DRAAF Nouvelle-Aquitaine](#).

→ Des **incendies** ont ravagé des forêts dans le Cher et le Loir-et-Cher en juillet, confirmant ce risque désormais présent dans la région. La meilleure réponse reste la surveillance permanente pour intervenir rapidement, complétée par des aménagements DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies). Ils s'appuient sur les OLD (Obligations Légales de Débroussaillage) dans les massifs classés à risque, visant à réduire la masse combustible, créer des discontinuités végétales et limiter la propagation du feu. Les zones incendiées, particulièrement les peuplements de pins, favorisent la reproduction des scolytes. Il est donc important d'extraire rapidement les bois brûlés pour éviter une pullulation de ce ravageur.

→ **Evolution de la maladie des bandes rouges sur pin laricio** : après deux années de végétation arrosées favorables au développement du champignon, les symptômes de la maladie des bandes rouges n'ont pas été observés sur la pousse de 2025, présageant une présence moindre en 2026.

→ **Première observation de cicadelle des pins** : elle a été vue sur pin rigida en forêt de Vouzeron (18). L'attaque, visible en mai, se signale par des décolorations/jaunissements répartis sur les aiguilles de l'année sous forme de code barre. Elle peut être confondue avec la maladie des bandes rouges. L'insecte, d'origine méridionale, crée de fortes défoliations en Bourgogne-Franche-Comté depuis 2022. Elles sont pour l'instant faibles chez nous : 6 ha touchés avec seulement 10 % de tiges concernées en sévérité moyenne.



Symptômes et insecte de cicadelle des pins

Vos interlocuteurs en 2026



Forêts privées

Cher hors Sologne

David HOUMEAU
david.houmeau@cnpf.fr
07 77 94 95 52

Sologne du Cher

Joseph GAINCHE
joseph.gainche@cnpf.fr
06 11 25 85 78

Eure-et-Loir

Clément GREBONVAL
clement.grebouval@cnpf.fr
06 14 52 88 38

Indre

Bruno JACQUET
bruno.jacquet@cnpf.fr
06 14 52 88 84

Indre

Adrian VALETTE
valette.atysgestion@gmail.com
06 88 10 05 88

Indre-et-Loire

Pierre SYMULAK
pierre.symulak@cnpf.fr
06 62 54 81 61

Loir-et-Cher Nord et Sologne Ouest

Evaëlle BOURDAIS
evaëlle.bourdais@cnpf.fr
06 14 52 88 40

Orçay, Theillay, Salbris et Souesmes

Joseph GAINCHE
joseph.gainche@cnpf.fr
06 11 25 85 78

Loir-et-Cher Sologne

Clément DESCHAMPS
clement.deschamps@cnpf.fr
06 14 52 88 33

Loiret

Constant GAUBERT
constant.gaubert@cnpf.fr
06 18 58 40 50

Pierre-Edmond LELIEVRE
pe.lelievre@sylvocab.com
06 71 26 51 63

Centre-Val de Loire

Jérôme ROSA
jerome.rosa@cnpf.fr
06 14 52 88 65



Forêts publiques

Eure-et-Loir

Thifany DEVOS
thifany.devos@onf.fr
06 11 40 91 56

Indre / Cher

Angélique BESSON
angelique.besson@onf.fr
06 11 99 02 20

Loir-et-Cher / Indre-et-Loire

Luce PARRET
luce.parret@onf.fr
06 15 36 23 36

Loiret

Nicolas PERRETTE
nicolas.perrette@onf.fr
06 66 21 38 08



Le présent document est le fruit des observations des **correspondants-observateurs**, qui détectent, diagnostiquent et surveillent les problèmes phytosanitaires et les écosystèmes forestiers. Ils appartiennent aux administrations et organismes forestiers et sont sous le pilotage du Pôle interrégional Nord-Ouest de la Santé des Forêts.

→ [En savoir plus sur les correspondants-observateurs](#)

 ephytia
ephytia.inra.fr