



B. Obile

Plantation de Pin maritime ennoyé au printemps.

GESTION

La santé des forêts en 2016

Les correspondants-observateurs du Département Santé des Forêts surveillent la santé de vos bois*. 2016 a été marquée par 2 évènements climatiques.

Extrêmes climatiques

Après les grandes inondations de fin mai (surtout Loiret et Seine-et-Marne), la sécheresse a été très marquée de juillet à octobre.

Les plantations ont montré de fortes mortalités, notamment en Pin maritime (Centre-Val de Loire), chêne et douglas. En cause: ennoisement des plants, sécheresse, mais aussi problèmes techniques. À l'inverse les plantations qui ont le mieux résisté présentent:

- une essence adaptée au sol,
- un terrain bien préparé (intervention appropriée, en conditions saines)
- une mise en place des plants soignée (potet travaillé).

Feuillus: châtaignier et frêne fragiles

Des dépérissements inquiétants de parcelles de châtaigniers ont été observés dans nos 2 régions. Plusieurs facteurs s'ajoutent à la sécheresse: sol inadapté, encre et cynips en progression...

La sécheresse a eu jusqu'alors peu de conséquences visibles sur les chênes adultes, hormis des couleurs automnales précoces. On a toutefois observé au printemps

des défoliations parfois localement fortes sur chênes et charme (Loiret, Cher, Loir-et-Cher, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne), ainsi que l'oïdium très présent cet été. La vigilance reste donc d'actualité pour le Chêne pédonculé en condition de croissance limite.

La **Chalarose du frêne** touche désormais tous nos départements. Les dégâts commencent à être visibles en Ile-de-France.

Le Pin laricio retrouve des couleurs... vertes !

Les 2 étés secs successifs semblent avoir ralenti la maladie des bandes rouges sur Pin laricio. Les houppiers retrouvent depuis l'an passé un aspect normal. La virulence du champignon paraît fortement influencée par les conditions climatiques. On veillera donc à:

- **avant plantation**, ne réserver le Pin laricio qu'aux sols qui lui sont le plus favorables, éviter les zones de confinement (plus humides) et diversifier les essences sur la propriété,
- pratiquer des **éclaircies régulières**, dès que le couvert est refermé,
- à l'approche de la maturité suivre



Dépérissement de châtaignier dû à l'encre.

l'accroissement annuel pour appréhender l'intérêt de renouveler rapidement le peuplement ou de le maintenir encore quelques années.

Jérôme ROSA
Technicien au CRPF
Correspondant-observateur du DSF

* Extrait des bilans annuels du pôle interrégional nord-ouest de la santé des forêts en Centre-Val de Loire et Ile-de-France, consultables sur le site www.cnpf.fr/ifc

Contacts :

Techniciens du CRPF (également correspondants-observateurs du Département Santé des Forêts (DSF)) : voir page 12